

Calendriers de vaccination financée par le secteur public en Ontario

Janvier 2021

À quoi sert ce document?

Ce document décrit les calendriers de vaccination financée par le secteur public en Ontario à compter de janvier 2021.

Ce document est destiné principalement aux fournisseurs de soins de santé qui administrent des vaccins. Il sert de référence pour les gens qui administrent les vaccins et fournit des renseignements sur :

- 1. le calendrier de vaccination systématique**
- 2. les calendriers de rattrapage**
- 3. les programmes et calendriers de vaccination pour les sujets à risque élevé**
- 4. les critères d'admissibilité pour tous les vaccins financés par le secteur public**
- 5. les intervalles minimaux et recommandés entre les doses pour les séries de vaccins.**

Utilisation du document

Les calendriers de vaccination systématique et de rattrapage de l'Ontario constituent les premières pages de ce document. Ces calendriers sont petits et peuvent être difficiles à lire. Pour vous procurer une version agrandie, rendez-vous sur <http://health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/schedule.aspx>, où ils sont disponibles sous forme de fichier PDF à télécharger. Ce fichier devra être imprimé et les calendriers assemblés pour en faire des documents plus faciles à lire.

Ces calendriers agrandis peuvent être affichés ou conservés avec une copie imprimée de ce document comme outils de référence là où les vaccins sont administrés.

Le reste de ce document contient des renseignements sur l'admissibilité à tous les vaccins financés par le secteur public, les programmes

pour les sujets à risque élevé et les intervalles de vaccination (minimaux et recommandés) pour les séries de vaccins.

Les renseignements sur les intervalles entre les doses de vaccin servent pour les cas où les vaccins n'ont pas été administrés conformément aux calendriers.

L'intervalle *minimal* est le délai le plus court à respecter entre deux doses de vaccin d'une série afin qu'on puisse s'attendre à une réaction d'immunisation. Cependant, il est préférable de respecter l'intervalle *recommandé* autant que possible, car on obtiendra une immunisation optimale, ou c'est l'intervalle qui a produit les meilleurs résultats d'efficacité. Il en va de même pour les indications d'âge.

Ce document comprend également des renseignements sur comment administrer les séries de doses de pneu-C-13 et Tdap-IPV selon l'âge actuel du sujet et les doses reçues précédemment.

Les gens qui administrent les vaccins ont la responsabilité de s'assurer que leurs connaissances sont à jour en utilisant les lignes directrices et les ressources qui conviennent comme les monographies de produits de vaccination et le *Guide canadien d'immunisation* (www.canada.ca/fr/sante-publique/services/guide-canadien-immunisation.html).

Les gens qui administrent les vaccins qui ont des questions sur les calendriers de vaccination financée par le secteur public en Ontario sont invités à communiquer avec leur bureau de santé publique (voir coordonnées pages 13-14).

Calendriers de vaccination financée par le secteur public en Ontario – janvier 2021

La vaccination financée par le secteur public est un service gratuit qui ne peut être offert qu'aux personnes admissibles.

| Calendrier de vaccination systématique : vaccination commencée au cours de la petite enfance | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|--------|--------|-------------------|---------|---------|-------|------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-----------------|
| Vaccin | Âge | 2 mois | 4 mois | 6 mois | 1 an ^Φ | 15 mois | 18 mois | 4 ans | 7 ^e année d'école | 14 ans | 24 ans | 34 ans ou plus ^Υ | 65 ans |
| DTCa-VPI-Hib Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite et <i>Haemophilus influenzae</i> de type b | | ◆ | ◆ | ◆ | | | ◆ | | | | | | |
| Pneu-C-13 Antipneumococcique-13 conjugué | | ◆ | ◆ | | ◆ | | | | | | | | |
| Rot-5 Rotavirus | | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | | | | |
| Men-C-C Antiméningococcique conjugué du sérogroupe C | | | | | ◆ | | | | | | | | |
| RRO Rougeole, rubéole, oreillons | | | | | ■ | | | | | | | | |
| Var Varicelle | | | | | | ■ | | | | | | | |
| RROV Rougeole, rubéole, oreillons, varicelle | | | | | | | | ■ | | | | | |
| dcaT-VPI Tétanos, diphtérie, coqueluche, poliomyélite | | | | | | | | ◆ | | | | | |
| HB Hépatite B | | | | | | | | | ● | | | | |
| Men-C-ACYW Antiméningococcique conjugué du groupe ACYW-135 | | | | | | | | | ● | | | | |
| VPH-9 Virus du papillome humain | | | | | | | | | ● | | | | |
| dcaT Tétanos, diphtérie, coqueluche | | | | | | | | | | ◆ | ◆ | | |
| dT (rappel) Tétanos, diphtérie | | | | | | | | | | | | ◆ | Tous les 10 ans |
| HZ Zona ou herpès zoster | | | | | | | | | | | | | ■ |
| Pneu-P-23 Antipneumococcique polysaccharidique 23 valent | | | | | | | | | | | | | ■ |
| Inf Grippe | | | | | | | | | | | | | |

* Tous les automnes

◆ - dose de vaccin unique administrée par injection intramusculaire.
 ■ - dose de vaccin unique administrée par injection sous-cutanée.
 ▲ - dose de vaccin unique administrée par voie orale.
 ● - offert dans le cadre des programmes de vaccination en milieu scolaire. Le vaccin Men-C-ACYW consiste en une dose unique; le vaccin HB consiste en une série de 2 doses (voir tableau 6); le vaccin VPH-9 consiste en une série de 2 doses (voir tableau 10). Les doses de vaccin sont administrées par injection intramusculaire.
 Φ - à administrer après le premier anniversaire de naissance et avant 16 mois.

Υ - après l'administration de la dose de dcaT à l'âge adulte (24 ans), les adultes devraient recevoir un vaccin de rappel dT tous les 10 ans.
 I - le vaccin contre l'herpès zoster consiste en une série de 2 doses administrées par injection intramusculaire (voir tableau 12)
 * - Les enfants âgés de 6 mois à 8 ans qui n'ont jamais reçu de vaccin antigrippal doivent recevoir 2 doses à 4 semaines d'intervalle ou plus. Les enfants qui ont déjà reçu au moins 1 dose de vaccin antigrippal doivent recevoir par la suite 1 dose par saison de la grippe.
Remarque : Un calendrier différent et (ou) des doses additionnelles peuvent être nécessaires chez les sujets qui présentent un risque élevé (voir tableau 3) et ceux qui ont manqué une dose de vaccin (voir les tableaux 4-24 pertinents).

Calendriers de vaccination financée par le secteur public en Ontario – janvier 2021

La vaccination financée par le secteur public est un service gratuit qui ne peut être offert qu'aux personnes admissibles.

| Calendrier de rattrapage n° 1 : vaccination commencée chez les enfants de 1 à 6 ans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------|-----------|---|-----------|-------|--|-------|---|-------|---|-----------|------------------------------|-----------|---|-----------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|--|--------|--|--|--|---|
| Vaccin | 1 ^{er} rendez-vous | | | 2 ^e rendez-vous : 2 mois après le 1 ^{er} rendez-vous | | | 3 ^e rendez-vous : 2 mois après le 2 ^e rendez-vous | | 4 ^e rendez-vous : 6 à 12 mois après le 3 ^e rendez-vous | | 5 ^e rendez-vous : enfants âgés de 4 à 6 ans, 6 à 12 mois après le 4 ^e rendez-vous (seulement si l'enfant avait moins de 4 ans au 4 ^e rendez-vous) | | 7 ^e année d'école | | 14 à 18 ans [§] | | 24 à 28 ans [†] | | 34 ans et plus [¶] | | 65 ans | | | | |
| | Enfant de | | Enfant de | | Enfant de | | Enfant de | | Enfant de | | Enfant de | | Enfant de | | Adulte qui au rendez-vous précédent avait | | moins de 18 ans [†] | | plus de 18 ans [¶] | | | | | | |
| | moins de 4 ans | 4 ans | 5 à 6 ans | moins de 2 ans | 2 à 3 ans | 4 ans | 5 à 6 ans | 7 ans | moins de 7 ans | 7 ans | moins de 4 ans | 4 à 8 ans | moins de 4 ans | 4 à 8 ans | moins de 18 ans [†] | plus de 18 ans [¶] | | | | | | | | | |
| DcaT-VPI-Hib | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | | | | | | | | | | | | |
| Pneu-C-13 | ◆ | ◆ | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RRO | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RROV | | ■ | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Var | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Men-C-C | ◆ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dcaT-VPI | | | | | | | | ◆ | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | |
| HB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Men-C-ACYW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VPH-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dcaT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ |
| HZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneu-P-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

* Tous les autismes

◆ - dose de vaccin unique administrée par injection intramusculaire.

■ - dose de vaccin unique administrée par injection sous-cutanée.

● - offert dans le cadre des programmes de vaccination en milieu scolaire. Le vaccin Men-C-ACYW consiste en une dose unique; le vaccin HB consiste en une série de 2 doses (voir tableau 6); le vaccin VPH-9 consiste en une série de 2 doses (voir tableau 10). Les doses de vaccin sont administrées par injection intramusculaire.

§ - Administré 10 ans après la dose de dcaT-VPI administrée à de 4 à 8 ans.

† - Administré 10 ans après la dose de dcaT administrée à l'adolescence.

¶ - Après l'administration de la dose de dcaT à l'âge adulte (après 18 ans), les adultes devraient recevoir un vaccin dT de rappel tous les 10 ans.

■ - le vaccin contre l'herpès zoster consiste en une série de 2 doses administrées par injection intramusculaire (voir tableau 12)

* - Les enfants âgés de 6 mois à 8 ans qui n'ont jamais reçu de vaccin antigrippal doivent recevoir 2 doses à 4 semaines d'intervalle ou plus. Les enfants qui ont déjà reçu au moins 1 dose de vaccin antigrippal doivent recevoir par la suite 1 dose par saison de la grippe.

Remarque : Un calendrier différent et (ou) des doses additionnelles peuvent être nécessaires chez les sujets qui présentent un risque élevé (voir tableau 3) et ceux qui ont manqué une dose de vaccin (voir les tableaux 4-24 pertinents).

Calendriers de vaccination financée par le secteur public en Ontario – janvier 2021

La vaccination financée par le secteur public est un service gratuit qui ne peut être offert qu'aux personnes admissibles.

| Calendrier de rattrapage n° 2 : vaccination commencée chez les enfants de 7 à 17 ans | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------|--|-------------|--|---|---|--|--|---|--------|
| Âge Vaccin | 1 ^{er} rendez-vous | | 2 ^e rendez-vous : 2 mois après le 1 ^{er} rendez-vous | | 3 ^e rendez-vous : 6 à 12 mois après le 2 ^e rendez-vous | 7 ^e à 12 ^e année d'école (garçons nés en 2004 ou après) | 7 ^e à 12 ^e année d'école (filles) | 10 ans après le 3 ^e rendez-vous | 10 ans après le rendez-vous précédent (seulement si l'enfant avait moins de 18 ans au rendez-vous précédent) | Tous les 10 ans après le rendez-vous précédent* | 65 ans |
| | moins de 13 ans | 13 à 17 ans | moins de 13 ans | 13 à 18 ans | | | | | | | |
| dcaT-VPI | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | | | | | | |
| RROV | ■ | | ■ | | | | | | | | |
| RRO | | ■ | | ■ | | | | | | | |
| Var | | ■ | | ■ | | | | | | | |
| Men-C-C | ▶ | | | | | ● | | | | | |
| HB | | | | | | | | | | | |
| Men-C-ACYW | | | | | | | | | | | |
| VPH-9 | | | | | | | | | | | |
| dcaT | | | | | | | | | ◆ | | |
| dT | | | | | | | | | | ◆ | |
| HZ | | | | | | | | | | | ■ |
| Pneu-P-23 | | | | | | | | | | | ■ |
| Inf | | | | | | | | | | | |

* Tous les automnes

◆ - dose de vaccin unique administrée par injection intramusculaire.

■ - dose de vaccin unique administrée par injection sous-cutanée.

▶ - les sujets nés le 1^{er} septembre 2003 ou après peuvent recevoir une dose de Men-C-C (administrée par injection intramusculaire). Ces sujets pourront également recevoir le vaccin Men-C-ACYW lorsqu'ils entreront en 7^e année d'école. Si le sujet reçoit le vaccin Men-C-C n'est plus recommandé.

● - offert dans le cadre des programmes de vaccination en milieu scolaire. Le vaccin Men-C-ACYW consiste en une dose unique; le vaccin HB consiste en une série de 2 doses (voir tableau 6); le vaccin VPH-9 consiste en une série de 2 ou 3 doses (voir tableau 10 et 11). Les doses de vaccin sont administrées par injection intramusculaire à l'aide d'une seringue et d'une aiguille.

¶ - Après l'administration de la dose de dcaT à l'âge adulte, les sujets devraient recevoir un vaccin dT de rappel tous les 10 ans.

■ - le vaccin contre l'herpès zoster consiste en une série de 2 doses administrées par injection intramusculaire (voir tableau 12)

* - Les enfants âgés de 6 mois à 8 ans qui n'ont jamais reçu de vaccin antigrippal doivent recevoir 2 doses à 4 semaines d'intervalle ou plus. Les enfants qui ont déjà reçu au moins 1 dose de vaccin antigrippal doivent recevoir par la suite 1 dose par saison de la grippe.

Remarque : Un calendrier différent et (ou) des doses additionnelles peuvent être nécessaires chez les sujets qui présentent un risque élevé (voir tableau 3) et ceux qui ont manqué une dose de vaccin (voir les tableaux 4-24 pertinents).

| Calendrier de rattrapage n° 3 : vaccination commencée chez les adultes de 18 ans et plus | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--|---------------------------------|--|--|---|--|--|---|--------|
| Âge Vaccin | 1 ^{er} rendez-vous | | | 2 ^e rendez-vous : 2 mois après le 1 ^{er} rendez-vous | | | Sujet né | | | 3 ^e rendez-vous : 6 à 12 mois après le 2 ^e rendez-vous | Tous les 10 ans après le 3 ^e rendez-vous | 65 ans |
| | en 1985 ou avant | de 1986 à 1996 | de 1997 à 1999 | en 2000 ou après | en 2000 ou après de 19 à 25 ans | en 2000 ou après et âgé de 19 à 25 ans | en 1999 ou avant et âgé de 20 à 25 ans | en 1999 ou avant et âgé de 26 ans et plus | | | | |
| dcaT-VPI | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | | | | | | | | |
| RRO | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Var | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Men-C-ACYW | | | ◆ | | | | | | | | | |
| Men-C-C | | ◆ | | | | | | | | | | |
| dT | | | | | | | | | | | | |
| VPI | | | | | | | ◆ | ◆ | | | | |
| HZ | | | | | | | ◆ | ◆ | | | | |
| Pneu-P-23 | | | | | | | | | | | | ■ |
| Inf | | | | | | | | | | | | |

* Tous les automnes

◆ - dose de vaccin unique administrée par injection intramusculaire.

■ - dose de vaccin unique administrée par injection sous-cutanée.

■ - le vaccin contre l'herpès zoster consiste en une série de 2 doses administrées par injection intramusculaire (voir tableau 12)

Remarque : Un calendrier différent et (ou) des doses additionnelles peuvent être nécessaires chez les sujets qui présentent un risque élevé (voir tableau 3) et ceux qui ont manqué une dose de vaccin (voir les tableaux 4-24 pertinents).

Tableau 1 : administration des vaccins

| Voie d'administration | Sujet vacciné | Calibre d'aiguille recommandé | Longueur d'aiguille recommandée |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|
| Intramusculaire (IM) Remarque : Pour les injections IM, utiliser une aiguille assez longue pour atteindre la partie la plus grosse du muscle. | Bébés, enfants en bas âge et enfants plus âgés | 22 - 25 | 2,2 cm - 2,5 cm (7/8 po-1 po) |
| | Adolescents et adultes | 22 - 25 | 2,5 cm - 3,8 cm (1 po-1½ po) |
| Sous-cutanée (SC) | Tous âges | 25 | 1,6 cm (5/8 po) |
| Orale (VO) | Nourrissons | s. o. | s. o. |
| Intranasale (IN) | Tous âges | s. o. | s. o. |

Remarques :

- Pour trouver des renseignements sur la voie, le site et la méthode d'administration, consulter le *Guide canadien d'immunisation* sur <http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p01-07-fra.php>
- Ne jamais mélanger et administrer des vaccins différents ensemble dans une même seringue, sauf si c'est indiqué dans la monographie du produit.
- Toujours utiliser le diluant fourni avec le produit pour reconstituer un vaccin.

Tableau 2 : critères d'admissibilité pour tous les vaccins financés par le secteur public

| Vaccins financés par le secteur public | Voie d'administration | Groupes d'âge admissibles à la vaccination financée par le secteur public | |
|--|-----------------------|--|---|
| | | Vaccination systématique | Vaccination des sujets à risque élevé |
| DCaT-VPI-Hib Diphthérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite et <i>Hæmophilus influenzae</i> de type b | IM | 6 semaines - 6 ans | 5 - 6 ans (voir tableau 3) |
| HA Hépatite A | IM | | ≥ 1 an (voir tableau 3) |
| HB Hépatite B | IM | 7 ^e et 8 ^e années d'école | ≥ 0 an (voir tableau 3) |
| Hib <i>Hæmophilus influenzae</i> de type b | IM | 6 semaines - 6 ans | ≥ 5 ans (voir tableau 3) |
| HZ Zona ou herpès zoster | IM | 65 - 70 ans Remarque : série de 2 doses à administrer avant le 71 ^e anniversaire. | |
| VPH-9 Virus du papillome humain | IM | • Filles de la 7 ^e à la 12 ^e année d'école • Garçons de la 7 ^e à la 12 ^e année d'école nés en 2004 ou après | Garçons et hommes de 9 - 26 ans (voir tableau 3) |
| Inf Grippe | IM | ≥ 6 mois | |
| VPI Poliomyélite | SC | ≥ 6 semaines | ≥ 18 ans (voir tableau 3) |
| 4CMenB Antiméningococcique multi-composant du sérotype B | IM | | 2 mois - 17 ans (voir tableau 3) |
| Men-C-C Antiméningococcique conjugué du sérotype C | IM | • Sujets de ≥ 1 an, nés le 1 ^{er} sept. 2003 ou après • Sujets nés de 1986 à 1996 | |
| Men-C-ACYW Antiméningococcique conjugué du groupe ACYW-135 | IM | • De la 7 ^e à la 12 ^e année d'école • Sujets nés en 1997 ou après | 9 mois - 55 ans (voir tableau 3) |
| RRO Rougeole, rubéole, oreillons | SC | ≥ 1 an | • 6 - 11 mois (voir tableau 3) • ≥ 18 ans (voir tableau 3) |
| RROV Rougeole, rubéole, oreillons, varicelle | SC | 4 - 12 ans | |
| Pneu-C-13 Antipneumococcique 13 conjugué | IM | 6 semaines - 4 ans | • 6 semaines - 6 mois (voir tableau 3) • ≥ 50 ans (voir tableau 3) |
| Pneu-P-23 Antipneumococcique polysaccharidique 23 valent | SC ou IM | ≥ 65 ans | • 2 - 64 ans (voir tableau 3) • ≥ 2 ans (revaccination) (voir tableau 3) |
| Rot-5 Rotavirus | VO | 6 - 32 semaines | |
| dT Tétanos, diphtérie | IM | ≥ 7 ans | |

Tableau 2 (suite) : critères d'admissibilité pour tous les vaccins financés par le secteur public

| Vaccins financés par le secteur public | Voie d'administration | Groupes d'âge admissibles à la vaccination financée par le secteur public | |
|---|-----------------------|--|--|
| | | Vaccination systématique | Vaccination des sujets à risque élevé |
| dcaT Tétanos, diphtérie, coqueluche | IM | ≥ 4 ans Remarque : Les adultes (≥ 18 ans) peuvent recevoir 1 dose du vaccin dcaT (normalement administrée 10 ans après la dose du vaccin dcaT administrée à l'adolescence). Toutefois, si la dose de rappel du vaccin dcaT doit être administrée plus tôt, ces adultes peuvent recevoir une dose du vaccin dcaT, quel que soit le temps écoulé depuis l'administration de la dernière dose d'un vaccin antitétanique ou antidiphtérique. | |
| dcaT-VPI Tétanos, diphtérie, coqueluche, poliomyélite | IM | ≥ 4 ans | ≥ 18 ans (voir tableau 3) |
| Var Varicelle | SC | Sujets de ≥ 1 an, nés en 2000 ou après | Sujets nés en 1999 ou avant (voir tableau 3) |

Remarques :

- Plus d'un vaccin peut protéger contre une même maladie. Il convient de choisir le vaccin le plus approprié selon l'âge et les besoins du sujet à vacciner, conformément aux calendriers recommandés.
- Quel que soit le calendrier de vaccination, si le sujet est partiellement immunisé ou s'il ne peut recevoir l'une des composantes d'un vaccin combiné en raison d'une contre-indication, un autre vaccin peut être administré, pourvu que le sujet soit admissible à le recevoir. Par exemple :
 - si la série de doses du VPI a été entièrement administrée, le vaccin dcaT peut être administré à la place du vaccin dcaT-VPI.
 - dans le même ordre d'idées, si le sujet ne peut recevoir le vaccin anticoquelucheux, les vaccins Td et VPI pour les personnes de 7 ans et plus peuvent être administrés au lieu du vaccin dcaT-VPI.

Consultez le bureau de santé publique de votre région pour connaître la disponibilité des vaccins financés par le secteur public pour la gestion des cas et des contacts liés aux maladies pouvant être prévenues par la vaccination.

Tableau 3 : vaccination des sujets à risque élevé

Les sujets à risque élevé doivent eux aussi être vaccinés conformément aux calendriers de vaccination systématique ou de rattrapage applicables (voir pages 2 à 4).

| Vaccins financés par le secteur public | Groupes d'âges admissibles à la vaccination financée par le secteur public | Nombre de doses admissibles | Intervalles entre les doses | Critères d'admissibilité des sujets à risque élevé |
|--|--|---|--|---|
| Hib | ≥ 5 ans | 1 ou 3 | Pour les sujets ayant reçu une greffe de CSH, voir tableau 9 | <ul style="list-style-type: none"> • Sujets atteints d'asplénie fonctionnelle ou anatomique (1 dose) • Sujets qui ont reçu une greffe de moelle osseuse ou d'organe plein (1 dose) • Sujets en attente d'un implant cochléaire ou l'ayant reçu (1 dose) • Sujets qui ont reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) (3 doses) • Sujets immunodéprimés en raison d'une maladie ou d'un traitement (1 dose) • Sujets qui ont reçu une greffe de poumon (1 dose) • Sujets ayant un déficit primaire en anticorps (1 dose) Remarque : Les enfants de 5 à 6 ans à risque élevé qui ont besoin des vaccins DCaT-VPI et Hib devraient recevoir le vaccin DCaT-VPI-Hib à la place du Hib. |
| DCaT-VPI-Hib | 5 - 6 ans | | | |
| HA | ≥ 1 an | 2 | Voir tableau 5 | <ul style="list-style-type: none"> • Sujets prenant des drogues par voie intraveineuse • Sujets atteints d'une hépatopathie chronique y compris l'hépatite B et C • Hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes |
| HB | ≥ 0 an | 2 à 4 (+ doses de rappel, au besoin) | Voir tableau 7 | <ul style="list-style-type: none"> • Enfants de < 7 ans dont la famille a immigré d'un pays où la prévalence du VHB est élevée ou qui peuvent être exposés à des porteurs du VHB au sein de leur parenté élargie (3 doses) • Contact familial ou sexuel avec un porteur chronique ou un cas grave (3 doses) • Sujets ayant des antécédents d'infections transmissibles sexuellement (3 doses) • Bébés nés de mères séropositives à l'égard du virus de l'hépatite B <ul style="list-style-type: none"> - Bébés prématurés pesant < 2 000 grammes à la naissance (4 doses) - Bébés prématurés pesant ≥ 2 000 grammes à la naissance et bébés nés à terme ou après (3 doses) • Sujets prenant des drogues par voie intraveineuse (3 doses) • Sujets atteints d'une hépatopathie chronique y compris l'hépatite C (3 doses) • Sujets en attente d'une greffe du foie (2^e et 3^e doses seulement) • Hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (3 doses) • Sujets ayant des partenaires sexuels multiples (3 doses) • Sujets ayant subi une piqûre ou une ponction par une aiguille ailleurs que dans un milieu de soins (3 doses) • Sujets en dialyse rénale ou atteints d'une maladie exigeant l'administration fréquente de produits sanguins (hémophilie, par exemple) (2^e et 3^e doses seulement) |
| VPH-9 | Garçons et hommes de 9 - 26 ans | 2 à 3 | Voir tableaux 10 et 11 | <ul style="list-style-type: none"> • Hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes |
| 4CMenB | 2 mois - 17 ans | 2 à 4 | Voir tableau 14 | <ul style="list-style-type: none"> • Sujets présentant un déficit acquis en complément (ceux qui reçoivent de l'éculizumab, par exemple) • Sujets atteints d'asplénie fonctionnelle ou anatomique • Sujets en attente d'un implant cochléaire ou l'ayant reçu • Sujets présentant un déficit en complément, properdine ou facteur D, ou un déficit primaire en anticorps • Sujets infectés par le VIH |
| Men-C-ACYW | 9 mois - 55 ans | 2 à 4 + doses de rappel | Voir tableau 15 | |
| Men-C-ACYW | ≥ 56 ans | 1 | Voir tableau 15 | |

Tableau 3 (suite) : vaccination des sujets à risque élevé

Les sujets à risque élevé doivent eux aussi être vaccinés conformément aux calendriers de vaccination systématique ou de rattrapage applicables (voir pages 2 à 4).

| Vaccins financés par le secteur public | Groupes d'âges admissibles à la vaccination financée par le secteur public | Nombre de doses admissibles | Intervalles entre les doses | Critères d'admissibilité des sujets à risque élevé |
|--|--|-------------------------------|---|--|
| RRO | 6-11 mois | 1 | Voir tableau 16 | <ul style="list-style-type: none"> Bébés pouvant voyager vers des régions ou pays où la maladie circule <p>Remarque : 2 doses additionnelles sont requises à ≥ 1 an et aux intervalles qui conviennent.</p> |
| | ≥26 ans | 1 (comme 2 ^e dose) | Voir tableau 16 | <ul style="list-style-type: none"> Les adultes qui n'ont reçu qu'une dose de vaccin RRO peuvent recevoir une 2^e dose : s'ils sont travailleurs de la santé s'ils sont étudiants du postsecondaire s'ils prévoient de voyager dans des régions où la maladie circule selon le jugement clinique du fournisseur de soins de santé. |
| Pneu-C-13 | 6 semaines - 6 mois | 1 (comme 4 ^e dose) | Voir tableau 17 | <ul style="list-style-type: none"> Les bébés qui répondent à un des critères 1 à 14 de risque élevé fixés pour le vaccin Pneu-P-23 peuvent recevoir une 4^e dose (voir critères d'admissibilité au vaccin Pneu-P-23) et doivent être vaccinés conformément au calendrier d'administration du vaccin Pneu-C-13 chez les sujets à risque élevé. |
| | ≥50 ans | 1 ou 3 | <p>Pour les sujets ayant reçu une greffe de CSH, voir tableau 18</p> <p>Intervalles entre vaccin Pneu-C-13 et vaccin Pneu-P-23, voir tableau 19</p> | <ul style="list-style-type: none"> Sujets atteints d'asplénie fonctionnelle ou anatomique (1 dose) Sujets présentant des déficits immunitaires congénitaux touchant n'importe quelle partie du système immunitaire, notamment l'immunité à médiation humorale (lymphocytes B), l'immunité à médiation cellulaire (lymphocytes T), le système du complément (déficit en properdine, ou en facteur D), ou la fonction phagocytaire (1 dose) Sujets infectés par le VIH (1 dose) Sujets ayant reçu une greffe de CSH (3 doses) Sujets recevant un traitement immunodépresseur, notamment usage prolongé de corticostéroïdes, chimiothérapie, radiothérapie, traitement à la suite d'une greffe d'organe, biothérapie et certains médicaments antirhumatismaux (1 dose) Sujets atteints de néoplasmes malins, y compris leucémie et lymphome (1 dose) Sujets atteints d'anémie drépanocytaire ou d'autres hémoglobinopathies (1 dose) Sujets en attente d'une greffe d'organe plein ou de cellules des îlots de Langerhans ou l'ayant reçue (1 dose) |
| Pneu-P-23 | 2 - 64 ans | 1 | | <ol style="list-style-type: none"> Sujets atteints d'asplénie (anatomique ou fonctionnelle), de dysfonctionnement splénique Sujets atteints d'une maladie cardiaque chronique Sujets présentant un écoulement chronique du liquide céphalorachidien Sujets en attente d'un implant cochléaire ou l'ayant reçu Sujets présentant des déficits immunitaires congénitaux primaires touchant n'importe quelle partie du système immunitaire, notamment l'immunité à médiation humorale (lymphocytes B), l'immunité à médiation cellulaire (lymphocytes T), le système du complément (déficit en properdine ou en facteur D), ou la fonction phagocytaire Sujets atteints de diabète sucré Sujets infectés par le VIH Sujets recevant un traitement immunodépresseur, notamment usage prolongé de corticostéroïdes à action générale, chimiothérapie, radiothérapie, traitement à la suite d'une greffe d'organe, certains médicaments antirhumatismaux et autres traitements immunosuppresseurs. Sujets atteints d'une hépatopathie chronique y compris hépatite B ou C et cirrhose hépatique, quelle que soit la cause Sujets atteints de néoplasmes malins, y compris leucémie et lymphome Sujets atteints d'une néphropathie chronique, y compris le syndrome néphrotique Sujets atteints d'une maladie respiratoire chronique, sauf asthmatiques, à moins qu'ils ne soient traités au moyen d'une forte dose de corticostéroïdes Sujets atteints d'anémie drépanocytaire ou d'autres hémoglobinopathies drépanocytaires Sujets en attente d'une greffe d'organe plein ou de cellules des îlots de Langerhans ou l'ayant reçue Sujets atteints d'une maladie neurologique chronique pouvant nuire à l'élimination des sécrétions orales Sujets en attente d'une greffe de CSH ou l'ayant reçue Pensionnaires de maisons de soins infirmiers, de résidences pour personnes âgées et d'établissements ou de services de soins aux malades chroniques |
| Pneu-P-23 | ≥2 ans | 1 (comme 2 ^e dose) | Voir tableau 20 | <p>Les sujets peuvent recevoir une 2^e dose (revaccination conférant une immunité à vie) de Pneu-P-23 s'ils répondent aux critères de risque élevé suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sujets atteints d'asplénie anatomique ou fonctionnelle ou d'anémie drépanocytaire Sujets atteints de cirrhose Sujets infectés par le VIH Sujets immunodéficients en raison d'une maladie ou d'un traitement Sujets atteints d'une insuffisance rénale chronique ou du syndrome néphrotique |
| VPI dcaT-VPI | ≥18 ans | 1 | | <p>Voyageurs qui ont reçu la série complète de vaccins contre la poliomyélite et qui se rendent dans une région où l'on sait ou l'on soupçonne que le poliovirus circule.</p> <p>Consulter les recommandations du Comité consultatif de la médecine tropicale et de la médecine des voyages (CCMTMV) sur http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-prmv/catmat-ccmtmv/index-fra.php</p> <p>Remarque : les voyageurs peuvent recevoir une dose unique de rappel du vaccin contenant le VPI conférant une immunité à vie. Choisir le vaccin qui convient le mieux (VPI ou dcaT-VPI, par exemple).</p> |
| Var | Sujets nés en 1999 ou avant | 2 | Voir tableau 16 | <ul style="list-style-type: none"> Enfants et adolescents vulnérables qui reçoivent un traitement chronique à l'acide salicylique Sujets vulnérables atteints de fibrose kystique Sujets-contact familiaux vulnérables de sujets immunodéficients Sujets vulnérables qui reçoivent une corticothérapie à faible dose ou des corticostéroïdes inhalés ou topiques Sujets vulnérables immunodéficients, voir le <i>Guide canadien d'immunisation</i> |

Intervalles entre les vaccins – recommandations et minimums

Remarque : suivre les indications des tableaux 8, 12, 13, 14, 15 et 17 pour amorcer une série de vaccins. Lorsque le calendrier de vaccination est interrompu, le nombre de doses requises pourrait être inférieur à celui du tableau. Consultez le *Guide canadien d'immunisation* ou le tableau 23 pour savoir que faire en cas d'interruption de la série de vaccin Pneu-C-13.

Tableau 4 : série de vaccination primaire DCaT-VPI-Hib et dcaT-VPI des enfants de < 7 ans

| Intervalles recommandés | Intervalles minimaux |
|---|---|
| 1 ^{re} dose de DCaT-VPI-Hib à ≥ 2 mois 2 ^e dose de DCaT-VPI-Hib 2 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose de DCaT-VPI-Hib 2 mois après la 2 ^e dose 4 ^e dose de DCaT-VPI-Hib, 6 à 12 mois après la 3 ^e dose et à ≥ 1 an En cas d'administration d'une 4 ^e dose à ≥ 4 ans et ≥ 24 semaines après la 3 ^e dose, administrer le vaccin dcaT-VPI 5 ^e dose de dcaT-VPI, 6-12 mois après la 4 ^e dose et à ≥ 4 ans La 5 ^e dose n'est pas requise si la 4 ^e dose est administrée à ≥ 4 ans et ≥ 24 semaines après la 3 ^e dose. | 1 ^{re} dose de DCaT-VPI-Hib à ≥ 6 semaines 2 ^e dose de DCaT-VPI-Hib, 4 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose de DCaT-VPI-Hib, 4 semaines après la 2 ^e dose 4 ^e dose de DCaT-VPI-Hib, 24 semaines après la 3 ^e dose et à ≥ 1 an En cas d'administration d'une 4 ^e dose à ≥ 4 ans et ≥ 24 semaines après la 3 ^e dose, administrer le vaccin dcaT-VPI. 5 ^e dose de dcaT-VPI, 24 semaines après la 4 ^e dose et à ≥ 4 ans La 5 ^e dose n'est pas requise si la 4 ^e dose est administrée à ≥ 4 ans et ≥ 24 semaines après la 3 ^e dose |
| Remarque : • Pour trouver les renseignements sur l'administration du DCaT-VPI-Hib, consulter le calendrier de vaccination systématique et le calendrier de vaccination de rattrapage n° 1. | |

Tableau 5 : série de vaccination contre l'hépatite A (HA) des sujets de ≥ 1 an à risque élevé

| Intervalles recommandés | Intervalles minimaux |
|---|--|
| 1 ^{re} dose 2 ^e dose, de 6 à 36 mois après la 1 ^{re} dose (selon le vaccin) | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 24 semaines après la 1 ^{re} dose |

Tableau 6 : série de vaccination contre l'hépatite B (HB) des sujets en 7^e année d'école

| Recombivax® HB première dose – intervalles | Engerix®-B première dose – intervalles |
|---|--|
| 1 ^{re} dose de Recombivax® HB en 7 ^e année d'école 2 ^e dose de Recombivax® HB ou d'Engerix®-B, 4 mois après la 1 ^{re} dose | 1 ^{re} dose d'Engerix®-B en 7 ^e année d'école 2 ^e dose d'Engerix®-B ou de Recombivax® HB, 6 mois après la 1 ^{re} dose |
| Remarque : Le calendrier à deux doses du vaccin HB et la préparation de ce vaccin sont approuvés pour usage chez les enfants de 11 à 15 ans. | |

Tableau 7 : série de vaccination contre l'hépatite B (HB) des sujets de ≥ 0 an à risque élevé

| Intervalles recommandés | Intervalles minimaux |
|--|---|
| 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 1 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 5 mois après la 2 ^e dose et à ≥ 24 semaines | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 4 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 8 semaines après la 2 ^e dose, 16 semaines après la 1 ^{re} dose et à ≥ 24 semaines |
| Remarques : • Les bébés prématurés pesant < 2 000 grammes à la naissance et nés de mères séropositives au virus de l'hépatite B doivent recevoir 4 doses: à la naissance et à 1, 2 et 6 mois • Pour connaître les préparations de vaccins appropriées et trouver des renseignements sur le dosage sérologique et les vaccins de rappel pour les sujets qui répondent aux critères de risque élevé pour le vaccin HB (voir tableau 3), consulter le <i>Guide canadien d'immunisation</i> . | |

Tableau 8 : série de vaccination contre *Haemophilus influenzae* de type b (Hib) des enfants de < 5 ans

| Âge à la 1 ^{re} dose | Intervalles recommandés | Intervalles minimaux |
|-------------------------------|--|--|
| 2 - 6 mois | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 2 mois après la 2 ^e dose 4 ^e dose, 2 mois après la 3 ^e dose et à ≥ 12 mois | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 4 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 4 semaines après la 2 ^e dose 4 ^e dose, 8 semaines après la 3 ^e dose et à ≥ 12 mois |
| 7 - 11 mois | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 2 mois après la 2 ^e dose et à ≥ 12 mois | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 8 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 8 semaines après la 2 ^e dose et à ≥ 12 mois |
| 12 - 14 mois | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 8 semaines après la 1 ^{re} dose |
| 15 - 59 mois | 1 ^{re} dose | 1 ^{re} dose |

Tableau 9 : série de vaccination contre *Haemophilus influenzae* de type b (Hib) des sujets de ≥ 5 ans qui ont reçu une greffe de CSH

| Intervalles recommandés | Intervalles minimaux |
|--|---|
| 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 12 mois après la 2 ^e dose | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 4 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 4 semaines après la 2 ^e dose |
| Remarque : La série de vaccins peut être amorcée de 6 à 12 mois après la greffe. | |

Tableau 10 : série de deux doses du vaccin VPH-9 pour

- élèves de la 7^e à la 12^e année d'école de < 15 ans en bonne santé
- garçons de 9 à 14 ans en bonne santé qui répondent aux critères de risque élevé

| Intervalles recommandés | Intervalles minimaux |
|---|--|
| 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 6 mois après la 1 ^{re} dose | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 24 semaines après la 1 ^{re} dose |
| Remarques : | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Les sujets infectés par le VIH et immunodéficients ou immunocompétents devront recevoir trois doses (voir tableau 11). • Chez les sujets de ≥ 15 ans en bonne santé qui ont reçu une dose de vaccin VPH2 ou VPH4 de 9 ans à moins de 15 ans, on peut utiliser un calendrier à 2 doses du vaccin VPH2 (filles seulement), VPH4 ou VPH9. | |

Tableau 11 : série de trois doses du vaccin VPH-9 pour

Sujets en bonne santé suivants :

- filles de la 7^e à la 12^e année d'école de ≥ 15 ans
- garçons de la 7^e à la 12^e année d'école de ≥ 15 ans nés en 2004 ou après
- garçons et hommes de 15 à 26 ans qui répondent aux critères de risque élevé

Sujets infectés au VIH et immunodéficients ou immunocompétents suivants :

- filles de la 7^e à la 12^e année d'école
- garçons de la 7^e à la 12^e année d'école nés en 2004 ou après
- garçons et hommes de 9 à 26 ans qui répondent aux critères de risque élevé

| Intervalles recommandés | Intervalles minimaux |
|---|---|
| 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 4 mois après la 2 ^e dose | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 4 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 12 semaines après la 2 ^e dose et 24 semaines après la 1 ^{re} dose |

Tableau 12 : série de vaccination contre le zona (herpès zoster) pour les sujets de 65 à 70 ans

| Âge à la 1 ^{re} dose | Intervalles recommandés | Intervalles minimaux |
|-------------------------------|---|---|
| 65 - 70 ans | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 2 à 6 mois après la 1 ^{re} dose | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 8 semaines après la 1 ^{re} dose |

Tableau 13 : série de vaccination VPI des sujets de ≥ 6 semaines

| Âge à la 1 ^{re} dose | Intervalles recommandés | Intervalles minimaux |
|-------------------------------|--|---|
| 6 semaines - 3 ans | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 2 mois après la 2 ^e dose 4 ^e dose, de 6 à 12 mois après la 3 ^e dose <i>La 4^e dose n'est pas requise si la 3^e dose est administrée à ≥ 4 ans et ≥ 24 semaines après la 2^e dose.</i> | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 4 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 4 semaines après la 2 ^e dose 4 ^e dose, 24 semaines après la 3 ^e dose <i>La 4^e dose n'est pas requise si la 3^e dose est administrée à ≥ 4 ans et ≥ 24 semaines après la 2^e dose.</i> |
| ≥ 4 ans | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 6 à 12 mois après la 2 ^e dose | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 4 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 24 semaines après la 2 ^e dose |

Tableau 14 : série de vaccination 4CMenB des enfants de 2 mois à 17 ans à risque élevé

| Âge à la 1 ^{re} dose | Intervalles recommandés | Intervalles minimaux |
|-------------------------------|--|--|
| 2 - 5 mois | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 2 mois après la 2 ^e dose 4 ^e dose, 2 mois après la 3 ^e dose et à ≥ 12 mois | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 4 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 4 semaines après la 2 ^e dose 4 ^e dose, 8 semaines après la 3 ^e dose et à ≥ 12 mois |
| 6 - 11 mois | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 2 mois après la 2 ^e dose et à ≥ 12 mois | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 8 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 8 semaines après la 2 ^e dose et à ≥ 12 mois |

Tableau 14 (suite) : série de vaccination 4CMenB des enfants de 2 mois à 17 ans à risque élevé

| Âge à la 1 ^{re} dose | Intervalles recommandés | Intervalles minimaux |
|-------------------------------|---|---|
| 12 mois - 10 ans | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 8 semaines après la 1 ^{re} dose |
| 11 - 17 ans | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 1 mois après la 1 ^{re} dose | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 4 semaines après la 1 ^{re} dose |

Tableau 15 : série de vaccination Men-C-ACYW (Menactra®) des sujets de 9 mois à 55 ans à risque élevé

| Âge à la 1 ^{re} dose | Intervalles recommandés | Intervalles minimaux |
|-------------------------------|---|---|
| 9 - 11 mois | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 2 mois après la 2 ^e dose et à ≥ 12 mois Dose de rappel tous les 3 à 5 ans | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 4 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 4 semaines après la 2 ^e dose 4 ^e dose, 4 semaines après la 3 ^e dose et à ≥ 12 mois <i>La 4^e dose n'est pas requise si la 3^e dose est administrée à ≥ 12 mois et ≥ 4 semaines après la 2^e dose.</i> Dose de rappel tous les 3 à 5 ans |
| 12 mois - 6 ans | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose Dose de rappel tous les 3 à 5 ans | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 4 semaines après la 1 ^{re} dose Dose de rappel tous les 3 à 5 ans |
| 7 - 55 ans | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose Doses de rappel tous les 5 ans | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 4 semaines après la 1 ^{re} dose Doses de rappel tous les 5 ans |

Remarques :

- Un intervalle de ≥ 4 semaines est requis entre les doses de Men-CACYW et de Men-C-C.
- Pour les sujets de ≥ 56 ans à risque élevé, une dose unique de Men-C-ACYW à vie peut être administrée ≥ 5 ans après la dernière dose de Men-C-ACYW.

Tableau 16 : séries de vaccination RRO, RROV et Var

| Ordre des vaccins | Intervalles recommandés | Intervalles minimaux |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| RRO puis RRO | 1 mois | 4 semaines |
| RRO puis RROV/RROV puis RRO | 3 mois | 6 semaines |
| RRO puis Var/Var puis RRO | 1 mois | 4 semaines |
| RROV puis RROV | 3 mois | 6 semaines |
| Var puis RROV/RROV puis Var | 3 mois | 6 semaines |
| Var puis Var | 3 mois | 6 semaines |

Remarque : Les vaccins RRO et Var peuvent être administrés au cours d'un même rendez-vous si nécessaire.

Tableau 17 : série de vaccination Pneu-C-13 des enfants de < 5 ans

| Âge à la 1 ^{re} dose | Sujets concernés | Intervalles recommandés | Intervalles minimaux |
|-------------------------------|------------------|---|---|
| 2 - 6 mois | En bonne santé | 1 ^{re} dose à ≥ 2 mois 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 2 mois après la 2 ^e dose et à ≥ 12 mois | 1 ^{re} dose à ≥ 6 semaines 2 ^e dose, 8* semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 8 semaines après la 2 ^e dose et à ≥ 12 mois |
| | À risque élevé | 1 ^{re} dose à ≥ 2 mois 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 2 mois après la 2 ^e dose 4 ^e dose, 2 mois après la 3 ^e dose et à ≥ 12 mois | 1 ^{re} dose à ≥ 6 semaines 2 ^e dose, 8* semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 8* semaines après la 2 ^e dose 4 ^e dose, 8 semaines après la 3 ^e dose et à ≥ 12 mois |
| 7 - 11 mois | Tous | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 2 mois après la 2 ^e dose et à ≥ 12 mois | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 8* semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 8 semaines après la 2 ^e dose et à ≥ 12 mois |
| 12 - 23 mois | Tous | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 8 semaines après la 1 ^{re} dose |
| 24 - 59 mois | Tous | 1 dose | 1 dose |

* Pour ces doses, le fabricant du vaccin indique que l'intervalle minimum est de 4 semaines, mais le *Guide canadien d'immunisation* recommande un intervalle minimum de 8 semaines entre les doses.

Remarque : Chez les enfants de ≥ 2 ans qui répondent aux critères de risque élevé pour le vaccin Pneu-P-23 (voir tableau 3), une dose de Pneu-P-23 doit être administrée ≥ 8 semaines après la dernière dose de Pneu-C-13.

Tableau 18 : série de vaccination Pneu-C-13 des sujets de ≥ 50 ans ayant reçu une greffe de CSH

| Intervalles recommandés | Intervalles minimaux |
|---|---|
| 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 1 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 1 mois après la 2 ^e dose | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 4 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 4 semaines après la 2 ^e dose |
| Remarque : Amorcer la série de 3 à 9 mois après la greffe; une dose de Pneu-P-23 doit être administrée de 12 à 18 mois après la greffe (de 6 à 12 mois après l'administration de la dernière dose de Pneu-C-13). | |

Tableau 19 : intervalles entre les doses de Pneu-C-13 et de Pneu-P-23 chez les adultes de ≥ 50 ans à risque élevé

- Une dose de Pneu-P-23 doit être administrée ≥ 8 semaines après la dernière dose de Pneu-C-13 (sauf chez les sujets qui ont reçu une greffe de CSH; voir tableau 17 pour connaître les intervalles).
- En revanche, si le sujet a déjà reçu le vaccin Pneu-P-23, 1 dose de Pneu-C-13 doit être administrée ≥ 1 an après la dernière dose de Pneu-P-23.

Tableau 20 : intervalles de revaccination Pneu-P-23 chez les sujets de ≥ 2 ans à risque élevé

- La 2^e dose (revaccination conférant une immunité à vie) doit être administrée ≥ 5 ans après la 1^{re} dose.

Tableau 21 : série de vaccination Rot-5 des bébés de < 32 semaines

| Intervalles recommandés | Intervalles minimaux |
|---|--|
| 1 ^{re} dose entre ≥ 2 mois et < 15 semaines 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 2 mois après la 2 ^e dose et à ≤ 32 semaines | 1 ^{re} dose entre ≥ 6 semaines et < 15 semaines 2 ^e dose, 4 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 4 semaines après la 2 ^e dose et à ≤ 32 semaines |
| <ul style="list-style-type: none"> • NE PAS administrer de dose de remplacement si pour une raison quelconque une dose incomplète a été administrée (un bébé crache le vaccin, par exemple). • La vaccination ne doit pas être amorcée chez les bébés de ≥ 15 semaines, car l'innocuité de l'administration de la première dose de vaccin Rot-5 chez les bébés plus âgés n'est pas connue. Si le vaccin Rot-5 est administré par inadvertance à un bébé de ≥ 15 semaines, le reste de la série de vaccinations Rot-5 doit être administré en respectant un intervalle minimum de quatre semaines entre chaque dose, et toutes les doses doivent être administrées avant l'âge de ≤ 32 semaines. | |

Tableau 22 : série de vaccination primaire dcaT-VPI et (ou) dT et VPI chez les sujets de ≥ 7 ans

| Intervalles recommandés | Intervalles minimaux |
|---|--|
| 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 6 à 12 mois après la 2 ^e dose | 1 ^{re} dose 2 ^e dose, 4 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 24 semaines après la 2 ^e dose |
| Remarque : Pour trouver des renseignements sur l'administration du dcaT-VPI et (ou) des vaccins Td et VPI, consulter les calendriers de rattrapage n ^{os} 2 et 3. | |

Séries de vaccinations interrompues

Tableau 23 : calendrier de vaccination Pneu-C-13 des enfants de < 5 ans qui n'ont pas reçu tous les vaccins de la série

| Âge actuel de l'enfant | Sujets concernés | Nombre de doses de Pneu-C-13 déjà reçues | Nombre de doses de Pneu-C-13 requises pour terminer la série et intervalles recommandés |
|------------------------|------------------|---|--|
| 2 - 6 mois | En bonne santé | 1 dose (1 ^{re} dose) | 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 2 mois après la 2 ^e dose et à ≥ 12 mois |
| | | 2 doses (1 ^{re} et 2 ^e doses) | 3 ^e dose, 2 mois après la 2 ^e dose et à ≥ 12 mois |
| | À risque élevé | 1 dose (1 ^{re} dose) | 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 2 mois après la 2 ^e dose 4 ^e dose, 2 mois après la 3 ^e dose et à ≥ 12 mois |
| | | 2 doses (1 ^{re} et 2 ^e doses) | 3 ^e dose, 2 mois après la 2 ^e dose 4 ^e dose, 2 mois après la 3 ^e dose et à ≥ 12 mois |
| 7 - 11 mois | Tous | 1 dose (1 ^{re} dose) | 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 2 mois après la 2 ^e dose et à ≥ 12 mois |
| | | 2 doses (1 ^{re} et 2 ^e doses) | 3 ^e dose, 2 mois après la 2 ^e dose et à ≥ 12 mois |
| 12 - 23 mois | Tous | 1 dose (1 ^{re} dose) à <12 mois | 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, 2 mois après la 2 ^e dose |
| | | 1 dose (1 ^{re} dose) à ≥12 mois | 2 ^e dose, 2 mois après la 1 ^{re} dose |
| | | 1 dose (1 ^{re} dose) à <12 mois et 1 dose (2 ^e dose) à ≥12 mois | 3 ^e dose, 2 mois après la 2 ^e dose |
| | | 2 doses ou plus à <12 mois | 1 dose, 2 mois après la dose la plus récente |

Tableau 23 (suite) : calendrier de vaccination Pneu-C-13 des enfants de < 5 ans qui n'ont pas reçu tous les vaccins de la série

| Âge actuel de l'enfant | Sujets concernés | Nombre de doses de Pneu-C-13 déjà reçues | Nombre de doses de Pneu-C-13 requises pour terminer la série et intervalles recommandés |
|------------------------|------------------|--|---|
| 24 - 59 mois | Tous | Toute série incomplète | 1 dose, 2 mois après la dose la plus récente |

Remarque : Pour déterminer si le calendrier de l'enfant a été interrompu et si des doses additionnelles sont requises afin de compléter le calendrier approprié selon l'âge actuel de l'enfant, consulter le tableau 17

Tableau 24 : calendrier de vaccination dcaT-VPI, dT et VPI et (ou) dT des sujets ≥ 7 ans qui n'ont pas reçu tous les vaccins de la série

| Nombre de doses de DCaT-VPI-[Hib] reçues à < 7 ans | Âge actuel du sujet | Poursuivre avec le nombre de doses de dcaT-VPI, de dT et VPI, et (ou) de dT pour terminer la série et intervalles recommandés |
|--|---------------------|---|
| 1 dose | 7 - 17 ans | 1 dose de dcaT-VPI 2 mois après la dose de DCaT-VPI-[Hib] 1 dose de dcaT 2 mois après la 1 ^{re} dose de dcaT-VPI 1 dose de dcaT-VPI de 6 à 12 mois après la dose de dcaT |
| | ≥18 ans | 1 dose de dcaT-VPI 1 dose de dT 2 mois après la dose de dcaT-VPI 1 dose de dT et VPI de 6 à 12 mois après la dose de dT |
| 2 doses | 7 - 17 ans | 1 dose de dcaT-VPI de 6 à 12 mois après la dose de DCaT-VPI-[Hib] 1 dose de dcaT, de 6 à 12 mois après la 1 ^{re} dose de dcaT-VPI |
| | ≥18 ans | 1 dose de dcaT-VPI 1 dose de dT de 6 à 12 mois après la dose de dcaT-VPI |
| 3 doses | ≥7 ans | 1 dose de dcaT-VPI de 6 à 12 mois après la dose de DCaT-VPI-[Hib] |
| 4 doses reçues à < 4 ans | ≥7 ans | 1 dose de dcaT-VPI |

Remarque : DCaT-VPI-[Hib] indique l'utilisation du DCaT-VPI-[Hib] ou du DCaT-VPI, selon l'âge de l'enfant.

Remarques générales :

- Les personnes admissibles comprennent celles qui possèdent une carte d'Assurance-santé de l'Ontario et les enfants qui fréquentent les services de garde agréés et les écoles élémentaires et secondaires.
- L'admissibilité aux vaccins financés par le secteur public peut être élargie dans certaines circonstances, telles que la gestion des cas et des contacts. Veuillez communiquer avec votre bureau de santé publique.
- Il n'est pas nécessaire de reprendre les séries de vaccins interrompues au début quel que soit le temps écoulé depuis l'administration de la dernière dose.
- Quand une plage d'âge est précisée, elle comprend les limites inférieure et supérieure. Par exemple :
 - « 4 - 6 ans » signifie du 4^e anniversaire au jour précédant le 7^e anniversaire;
 - « 6 mois - 8 ans » signifie de l'âge de 6 mois au jour précédant le 9^e anniversaire.
- Les vaccins administrés à chaque rendez-vous doivent être notés gratuitement sur le carnet de vaccination. Le carnet de vaccination jaune est un dossier personnel permanent et doit être apporté à chaque rendez-vous de vaccination.
- Pour fréquenter l'école en Ontario, conformément à la *Loi sur l'immunisation des élèves*, on doit posséder un carnet de vaccination à jour ou une exemption valide (les maladies désignées comprennent la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, la méningococcie, la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle); il en va de même pour fréquenter une garderie, conformément à la *Loi sur la garde d'enfants et la petite enfance* (consultez votre bureau de santé publique) : <http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx>
- Pour obtenir des renseignements complémentaires, consulter le *Guide canadien d'immunisation* (<http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php>).
- Pour trouver les indications et l'usage clinique des vaccins qui ne sont pas financés par le secteur public ou des vaccins à l'intention des voyageurs, consulter le Comité consultatif national de l'immunisation (<http://www.phac-aspc.gc.ca/naci-ccni/index-fra.php>) et le Comité consultatif de la médecine tropicale et de la médecine des voyages (www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/catmat-ccmtmv/index-fra.php).
- Toute manifestation clinique inhabituelle (MCI) à la suite d'une immunisation doit être déclarée au bureau de santé publique de votre région :
 - Liste des bureaux de santé publique : <http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx>
 - Le formulaire ontarien de Déclaration de manifestations cliniques inhabituelles (MCI) à la suite d'une immunisation se trouve sur le site de Santé publique Ontario : <http://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/Pages/Vaccine-Safety.aspx>

Pour trouver les calendriers de vaccination financée par le secteur public en Ontario les plus récents, consulter ontario.ca/vaccins.

Bureaux de santé publique de l'Ontario

Pour obtenir des renseignements complémentaires ou de l'aide en ce qui concerne les calendriers de vaccination financée par le secteur public en Ontario, veuillez communiquer avec votre bureau de santé public.

Consulter <http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx>

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Algoma | 705 942-4646 | 1 866 892-0172 |
| Comté de Brant | 519 753-4937 | |
| Chatham-Kent | 519 352-7270 | |
| Durham | 905 668-7711 | 1 800 841-2729 |
| Est de l'Ontario | 613 933-1375 | 1 800 267-7120 |
| Grey-Bruce | 519 376-9420 | 1 800 263-3456 |
| Haldimand-Norfolk | 519 426-6170 | 905 318-6623 |
| District de Haliburton, Kawartha, Pine Ridge | 1 866 888-4577 | |
| Halton | 905 825-6000 | 1 866 442-5866 |
| Hamilton | 905 546-2489 | |
| Hastings-Prince Edward | 613 966-5500 | |
| Huron Perth | 1 888 221-2133 | |
| Kingston, Frontenac et Lennox & Addington | 613 549-1232 | 1 800 267-7875 |
| Lambton | 519 383-8331 | |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| District de Leeds, Grenville et Lanark | 613 345-5685 | 1 800 660-5853 |
| Middlesex-London | 519 663-5317 | |
| Niagara | 905 688-3762 | 1 800 263-7248 |
| District de North Bay Parry Sound | 705 474-1400 | 1 800 563-2808 |
| Nord-ouest de l'Ontario | 807 468-3147 | 1 800 830-5978 |
| Ottawa | 613 580-6744 | 1 866 426-8885 |
| Peel | 905 791-7800 | 1 888 919-7800 |
| Peterborough | 705 743-1000 | 1 877 743-0101 |
| Porcupine | 705 267-1181 | 1 800 461-1818 |
| Comté de Renfrew et district | 613 732-3629 | 1 800 267-1097 |
| District de Simcoe Muskoka | 705 721-7520 | 1 877 721-7520 |
| Sud-ouest de l'Ontario | 1 800 922-0096 | |
| Sudbury et districts | 705 522-9200 | |
| District de Thunder Bay | 807 625-5900 | 1 888 294-6630 |
| Timiskaming | 705 647-4305 | 1 866 747-4305 |
| Toronto | 416 338-7600 | |
| Waterloo | 519 575-4400 | |
| Wellington-Dufferin-Guelph | 519 822-2715 | 1 800 265-7293 |
| Comté de Windsor-Essex | 519 258-2146 | 1 800 265-5822 |
| York | 905 895-4511 | 1 877 794-1880 |

